

済生会熊本病院レジメ一覧（膵がん）

レジメ名	薬剤名（一般名）	略号	投与量	施行日	1クール（日数）	催吐性リスク
GEM	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	軽度
GEM+Abraxane	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	中等度
	アブラキサナ（パクリタセルアルブミン懸濁型）	nab-PTX	125mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
GEM+S-1	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日	軽度
	ティーエスワン （テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム）	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-14		
Onivyde +5-FU/LV	オニバイド（イリノテカン）※ボスム製剤		70mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	中等度
	レボホリナート（レボホリナート）	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU（フルオロウラシル）持続	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1		
FOLFIRINOX(bolus 5-FU抜き)	オキサリプラチン（オキサリプラチン）	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	高度
	カンプト（イリノテカン）	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	day1		
	レボホリナート（レボホリナート）	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU（フルオロウラシル）持続	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1		

2022/2/1更新