

済生会熊本病院レジメー一覧（尿路上皮がん）

レジメン名	薬剤名（一般名）	略号	投与量	施行日	1クール（日数）	催吐性リスク
GEM	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	軽度
GC(GEM+CDDP)	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	高度
	シスプラチン（シスプラチン）	CDDP	70mg/m ²	day1		
M-VAC	メトトレキサート（メトトレキサート）	MTX	30mg/m ²	day1,15,22	28日	day1,15,22 : 軽度 day2 : 高度
	エタザール（ビンプラスチン）	VLB	3mg/m ²	day2,15,22		
	ドキシソルピシン（ドキシソルピシン）	DXR	30mg/m ²	day2		
	シスプラチン（シスプラチン）	CDDP	70mg/m ²	day2		
CBDCA+GEM	カルボプラチン（カルボプラチン）	CBDCA	AUC5	day1	28日	中等度
	ゲムシタピン（ゲムシタピン）	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15		
(3週毎)Pembrolizumab 200mg	キイトルーダ（ペムブロリズマブ）		200mg/body	day1	21日	最小度
(6週毎)Pembrolizumab 400mg	キイトルーダ（ペムブロリズマブ）		400mg/body	day1	42日	最小度
Avelumab維持療法	バベンチオ（アベルマブ）		10mg/kg	day1	14日	最小度
PADCEV	パドセブ（エンホルツマブ ベドチン）		1.25mg/kg	day1, 8, 15	28日	軽度

2022/2/1更新