

済生会熊本病院レジメ一覧(痔がん)

レジメン名	薬剤名(一般名)	略号	投与量	施行日	1クール(日数)	催吐性リスク
GEM	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	軽度
GEM(day1,8)+S-1	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8	21日	軽度
	ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-14		
FOLFIRINOX(bolus 5-FU抜き)	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	高度
	カンプト(イリノテカン)	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	day1		
	レボホリナート(レボホリナート)	l-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU(フルオウラシル)持続	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1		
GEM+Abraxane	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	28日	中等度
	アブラキサン(ナクリタセルアルブミン懸濁型)	nab-PTX	125mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
Onivyde +5-FU/LV	オニバイド(イリノテカン)※ゾーム製剤	-	70mg/m <sup>2</sup>	day1	14日	中等度
	レボホリナート(レボホリナート)	l-LV	200mg/m <sup>2</sup>	day1		
	5-FU(フルオウラシル)持続	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	day1		

2024/12/1更新