

済生会熊本病院レジメ一覧(腎細胞がん)

レジメン名	薬剤名(一般名)	略号	投与量	施行日	1クール(日数)	催吐性リスク
(2週毎)Nivolumab 240mg	オプジーボ(ニボルマブ)	Nivo	240mg/body	day1	14日	最小度
(4週毎)Nivolumab 480mg	オプジーボ(ニボルマブ)	Nivo	480mg/body	day1	28日	最小度
(3週毎)Nivolumab 240mg+Ipilimumab	オプジーボ(ニボルマブ)	Nivo	240mg/body	day1	21日	最小度
	ヤーボイ(イピリムマブ)	Ipi	1mg/kg	day1		
(3週毎)Axitinib+Pembrolizumab	インライタ(アキシチニブ)	-	10mg/日	連日服用	21日	最小度
	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	-	200mg/body	day1		
(2週毎)Axitinib+Avelumab	インライタ(アキシチニブ)	-	10mg/日	連日服用	14日	最小度
	パベンチオ(アベルマブ)	-	10mg/kg	day1		
(2週毎)Cabo+Nivo 240mg	カボメティクス(カボザンチニブ)	-	40mg/日	連日服用	14日	最小度
	オプジーボ(ニボルマブ)	Nivo	240mg/body	day1		
(4週毎)Cabo+Nivo 480mg	カボメティクス(カボザンチニブ)	-	40mg/日	連日服用	28日	最小度
	オプジーボ(ニボルマブ)	Nivo	480mg/body	day1		
(3週毎)Lenvatinib+Pembrolizumab 200mg	レンビマ(レンバチニブ)	-	20mg/日	連日服用	21日	中等度
	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	-	200mg/body	day1		
(6週毎)Lenvatinib+Pembrolizumab 400mg	レンビマ(レンバチニブ)	-	20mg/日	連日服用	42日	中等度
	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	-	400mg/body	day1		
(3週毎)術後補助Pembrolizumab 200mg	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	-	200mg/body	day1	21日	最小度
(6週毎)術後補助Pembrolizumab 400mg	キイトルーダ(ペムプロリズマブ)	-	400mg/body	day1	42日	最小度

2024/12/1更新